



TRICHOLINE VITIS, le nouvel allié bio-contrôle pour lutter contre les tordeuses

3 espèces de tordeuses contrôlées :

- *Eudémis*
- *Cochylis*
- *Eulia*

2 vols à couvrir en priorité :

- G2 et G3



Comment déterminer la période optimale de lâcher des Tricholine Vitis ?

- Grâce au piège delta et à la phéromone adaptée

Quand l'utiliser :

- 3 à 7 jours après les premiers papillons capturés

Quelle dose ?

- 100 diffuseurs par hectare à chaque application

Combien de fois :

- 2 applications par génération de tordeuse, à 15 jours d'intervalle


Durée d'action :

- Chaque diffuseur agit pendant 2 semaines

Comment :

- Accroché au cep ou au palissage, tout simplement

Comment positionner TRICHOLINE VITIS par rapport aux vols des tordeuses*




La diffusion des trichogrammes pendant 2 semaines permet une protection en continu de vos vignes.

Les trichogrammes contenus dans les diffuseurs sont prêts à éclore et à parasiter les œufs pondus par les femelles de tordeuses

*Courbe de vol issue du BSV Aquitaine n°24 de 2016

Comment positionner le produit ?

Appliquer Tricholine Vitis au début du vol, puis 15 jours après



Comment poser les diffuseurs ?


Accrocher TRICHOLINE VITIS aux ceps ou au palissage de la vigne grâce au crochet



Comment les répartir dans la parcelle ?

1) Accrocher le premier diffuseur à 5 mètres du bord de la parcelle

2) Accrocher les autres diffuseurs tous les 10 mètres en tous sens



Compatibilité avec les autres produits

Les trichogrammes sont sensibles à certaines matières actives. Pour une utilisation dans les meilleures conditions, se rapprocher de son conseiller technique pour établir un programme adapté.

En résumé, Tricholine Vitis c'est :

- L'efficacité
- La régularité des résultats
- Le spectre large

- La simplicité d'application
- Un profil environnemental favorable